

【訂正】 本誌掲載論文に誤りがありましたので、お詫びして下記のとおり訂正いたします。(編集部)

● vol.49 no.12 2021

■ 黒ショウガ抽出物含有食品が QOL に及ぼす影響—プラセボ対照ランダム化二重盲検並行群間比較試験—

- ・ p.2127 **ABSTRACT 「Methods」** ↓ 3 行目

(誤) containing 0.49 mg/day

(正) containing 0.32 mg/day

- ・ p.2128 右段「**1 試験食品**」の↑ 2 行目

(誤) 1 日摂取目安量あたり 0.49 mg

(正) 1 日摂取目安量あたり 0.32 mg

● vol. 50 no.1 2022

■ Single Administration of Taxifolin-rich Extract to Young Adults Improves Their Sequential Single Task Performance
—A Randomized, Placebo-controlled, Double-blind, Crossover Trial—

- ・ p.97 左段「3 Test food」 ↓ 2 ～ 5 行目の下線部

(誤) The taxifolin-containing food was a tablet that contained an extract from the bark of the Dahurian larch tree, and six tablets (1500 mg) were ingested together with water (250 mL).

(正) The taxifolin-containing food was a tablet that contained an extract from the xylem and cambium of the Dahurian larch tree, and six tablets (1500 mg) were ingested together with water (250 mL).

● vol. 50 no.4 2022

■ バナバ葉抽出物含有食品の摂取と運動負荷の併用が歩行機能、姿勢および QOL に及ぼす影響
—プラセボ対照ランダム化二重盲検並行群間比較試験—

- ・ p.714 右段 ↓ 3 行目の下線部

(誤) 第 12 胸椎および第 4 腰椎

(正) 第 12 胸椎および第 1 仙骨

- ・ p.714 右段 ↓ 「**5 統計解析**」 2 ～ 3 行目

(誤) 姿勢の評価指標である胸椎前弯角、腰椎後弯角

(正) 姿勢の評価指標である胸椎後弯角、腰椎前弯角