

【訂正】 本誌掲載論文に誤りがありましたので、お詫びして下記のとおり訂正いたします。(編集部)

● vol. 45 no. 6 2017

■ クリルオイルの摂取が膝関節の痛みにかかわる QOL に与える影響
—ランダム化プラセボ対照二重盲検並行群間比較試験—

・ p.1001 左段↑ 4 行目 (下線部に補足として追加)

クリルオイルの 1 日摂取量はクリルオイル低用量群で 500 mg, クリルオイル高用量群で 1000 mg 相当である。なお, クリルオイル低用量群 500 mg に含まれる EPA, DHA はそれぞれ 60 mg, 27.5 mg であり, クリルオイル高用量群 1000 mg に含まれる EPA, DHA はそれぞれ 120 mg, 55 mg である。サフラワー油に含まれる EPA, DHA はともに 0 mg である。クリルオイルは Superba™ 2 (アーカー・バイオマリン社製) を使用した。介入期間は 2016 年 7 月 4 日から 11 月 19 日までとした。

● vol. 46 no. 2 2018

■ Effect of Amla (*Embllica officinalis* Gaertn.) Extract Ingestion on Recovery of Body Temperature and Blood Flow Following Cold Stress
—A Randomized Double-blind Placebo-controlled Study—

・ p.227 ABSTRACT *Methods* ↓ 2 ~ 3 行目

(誤) 0.8 mg corilagin

(正) 4 mg ellagic acid

・ p.229 左段↑ 1 行目~右段↓ 2 行目 (下線部の修正と追加)

(誤)

The extract contained 0.2 g/100 g corilagin, measured by high performance liquid chromatography.

(正)

The extract contained 1 g/100 g ellagic acid, measured by acid hydrolysis followed by high performance liquid chromatography.