

【訂正】 本誌掲載論文に誤りがありましたので、以下のとおり訂正いたします。(編集部)

●Vol. 21 No. 5

■OPC-13340 の変異原性試験

	<誤>	→	<正>
・ p.203 左段 ↓ 2 行目	有意水準 5%以上を陽性とした。		有意水準は 5%とした。
・ p.204 右段 ↓ 14行目	(Table 2)		(データ不掲載)
・ p.205 Table 2 タイトル	pulse treatment		pulse and continuous treatments
・ p.209 Table 6 タイトル	micronucleated reticulocytes the ratio of reticulocytes		micronucleated PCE the ratio of PCE
脚注 a)	micronucleated reticulocytes 2000 reticulocytes		micronucleated PCE 2000 PCE
脚注 b)	reticulocytes		PCE
脚注 d)	reticulocytes		PCE

●Vol. 21 No. 6

■パーキンソン病に対する B-HT 920 (塩酸タリペキソール) の臨床効果

	<誤>	→	<正>
・ p. 280 表 7 Na の Wilcoxon 1 標本検定	N.S.		$p < 0.10$

●Vol. 21 Supplement 4

■MPC-1304 の生殖・発生毒性試験 (第 2 報)

	<誤>	→	<正>
・ p.186 右段 ↓ 2 行目	一般毒性学のおよび生殖に及ぼす影響		一般毒性学的影响

■MPC-1304 の生殖・発生毒性試験 (第 3 報)

・ p.193 Table 1 Nifedipine, No. of resorbed or dead fetuses	81(34.5)**	→	81(34.5)*
---	------------	---	-----------