

## お詫びと訂正

『小児内科』50巻（2018年）10号 特集 新薬が変える子ども医療—薬物の使い分けと作用機序

新しく開発された薬—代謝疾患，内分泌疾患

糖尿病：経口血糖降下薬（浦上達彦先生，他；pp1619～1623）

に誤りがございました。

お詫び申し上げますとともに，下記の通り訂正いたします。

表 1 わが国で使用されている経口血糖降下薬および GLP-1 受容体作動薬（2018年7月現在）

一般名	販売名	1錠中の含有量 (mg)	用法・用量
	グリコラン	250	500～750 mg/日 1日2～3回 食後
サキサグリブチン水和物	オングリザ	2.5, 5	5（～2.5）mg/日 1日1回
<b>誤→</b> 1日1回 朝食前または食後	ザファテック	50, 100	100 mg/週 週1回
オマリグリブチン	マリゼブ	12.5, 25	25 mg/週 週1回

1620 小児内科 Vol. 50 No. 10, 2018-10



表 1 わが国で使用されている経口血糖降下薬および GLP-1 受容体作動薬（2018年7月現在）

一般名	販売名	1錠中の含有量 (mg)	用法・用量
	グリコラン	250	500～750 mg/日 1日2～3回 食後
サキサグリブチン水和物	オングリザ	2.5, 5	5（～2.5）mg/日 1日1回
<b>正→</b> <u>トレラグリブチンコハク酸塩</u>	ザファテック	50, 100	100 mg/週 週1回
オマリグリブチン	マリゼブ	12.5, 25	25 mg/週 週1回

1620 小児内科 Vol. 50 No. 10, 2018-10